BANSO TOLONGA COVID-19



19 Novembre 2021
Bulletin Hebdomadaire #19

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Syndicat d'Entraide Chrétienne (SEC), le Domaine Islamique pour le Développement Social (DIDES), l'Eglise du Réveil au Congo (ERC), les Amis de la Bonne Communication (ABCommunication), Next Corp et le Ministère de la Santé pour répondre aux besoins en informations des communautés
Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les repartager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

CE QU'ON A ENTENDU :

Pourquoi on tient à donner aussi le vaccin contre la COVID-19 dans des pays chauds qui ne sont pas concernés ?

*Commune de Kimbanseke- **KINSHASA***

REPONSE

On tient à vacciner les populations des pays chauds car même ces pays sont tout aussi concernés par la pandémie de la COVID-19.

Vous pouvez contracter la COVID-19 sous n'importe quel climat, même par temps chaud ou ensoleillé.

La meilleure façon de se prévenir de l'infection contre la COVID-19 reste la vaccination et le respect des mesures barrières.

CE QU'ON A ENTENDU :

Est-ce que les Personnes Vivant avec le VIH (PVV) peuvent aussi être vaccinées contre la COVID-19.

*Commune de Masina- **KINSHASA***

REPONSE

Il est important d'envisager la vaccination si vous êtes séropositif(ve). De nombreuses personnes séropositives pour le VIH présentent déjà ou sont plus susceptibles de présenter les affections sous-jacentes prédisposant à la COVID-19 ou à une forme grave de la maladie en cas d'infection par le virus de la COVID-19. Ces affections sous-jacentes comprennent l'hypertension, le diabète, les taux élevés de cholestérol, une maladie pulmonaire, l'obésité, etc.
Les experts considèrent que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et efficaces pour les personnes atteintes du VIH. Les essais cliniques sur les vaccins de Moderna, de Pfizer-BioNTech et d'AstraZeneca ont porté sur un nombre relativement restreint de personnes séropositives pour le VIH, qui suivaient toutes un traitement antirétroviral, étaient toutes en bonne santé et se portaient bien.



CE QU'ON A ENTENDU :

Je ne suis pas malade, pourquoi prendre le vaccin contre la COVID-19 ?

Ville de Matadi - ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

N'attendez pas tomber malade pour se faire vacciner. Ce ne sont pas les malades qui doivent prendre le vaccin anti-COVID. La vaccination est très efficace pour la prévention de la COVID-19.
Il est observé chez les personnes vaccinées qui contractent le virus responsable de la COVID-19, que le vaccin réduit le risque d'avoir la forme grave de cette maladie. Il peut également contribuer à prévenir la transmission du virus à d'autres personnes.

Les vaccins contre la COVID-19 sont donc des outils essentiels de la riposte à la pandémie car ils offrent une protection contre les formes graves de la maladie et les décès.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin contre la COVID-19 provoque le cancer.

Ville de Matadi- ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Non. Le vaccin anti-COVID ne provoque pas le cancer. En revanche, les données scientifiques actuelles montrent que les personnes atteintes d'un cancer et immunodéprimées ont plus de chances de développer des formes graves de la COVID-19.

C'est pourquoi cette catégorie des personnes atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie sont inscrites sur la liste des personnes prioritaires à la vaccination COVID, quel que soit leur âge. "La décision de leur vaccination sera prise avec les équipes médicales, en fonction notamment de leurs traitements en cours, de leur état général et de la nature du vaccin.



CE QU'ON A ENTENDU :

L'on ne va prendre le vaccin anti-COVOD-19 qu'au cas où on voyage.

*Territoire de Kasangulu - **KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Le vaccin anti-COVID n'est pas seulement nécessaire qu'en cas de voyage. En effet, si vous n'êtes pas vacciné, vous continuez de courir un risque accru d'être infecté par le virus responsable de la COVID-19 et de le propager lors de voyages. Vous devez continuer à éviter les voyages non essentiels vers toutes les destinations.

Pour éviter cette restriction et éviter une éventuelle contamination, il vous est recommandé de vous faire vacciner et de continuer à pratiquer les mesures barrières.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin anti-COVOD-19 fait maigrir.

*Ville de Matadi - **KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Un vaccin prépare votre corps à combattre une infection, un virus ou une maladie particulière.

Il est donc peu probable que cela vous rende très malade ou provoquer un amaigrissement.

Cependant, certaines gens peuvent ressentir des effets secondaires, le plus souvent des douleurs aux bras ou une fièvre passagère.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin anti-COVOD-19 réduit la durée de vie humaine.

Ville de Matadi - ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Il n'y a pas des preuves que le vaccin anti-COVID réduit la durée de vie car la majorité des vaccinés sont toujours en vie.

En revanche, selon une étude, une seule dose de vaccin contre le coronavirus peut réduire de moitié la transmission du virus dans les foyers et donc augmenter la chance de survie en cas d'une contamination.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin anti-COVOD-19 affaibli le foie.

Ville de Matadi - ***KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Non. Le vaccin anti-COVID n'affaibli pas le foie. En revanche, de nombreuses personnes atteintes d'hépatite chronique présentent des lésions au foie et les affections sous-jacentes qui les prédisposent à la COVID-19 ou à une forme grave de la maladie en cas d'infection par le virus de la COVID-19. Il est donc important d'envisager la vaccination si vous êtes atteint(e) d'hépatite B ou C ou d'une maladie du foie.

Les chercheurs considèrent que le vaccin est sûr et efficace pour les personnes atteintes d'hépatite B ou C et d'autres maladies du foie telles que la stéatose hépatique (foie gras). Rien ne prouve que le vaccin affaibli le foie.



CE QU'ON A ENTENDU :

L'OMS impose aux pays les vaccins qu'il trouve utiles même s'ils ne sont pas efficaces.

*Ville de Matadi - **KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Le vaccin anti-COVID n'est pas un esprit.

C'est un produit physique qu'on inocule à une personne pour apprendre à son système immunitaire à reconnaître le virus à l'origine de la COVID-19. L'organisme peut ainsi combattre le virus s'il lui arrive d'être en contact avec lui.

Les vaccins peuvent réduire la gravité de la maladie si vous contractez le virus, et peuvent également contribuer à prévenir la transmission du virus à d'autres personnes. Ils n'ont rien à avoir avec les bons ou les mauvais esprits.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin anti-COVOD-19 n'a pas été expérimenté sur des animaux pendant au moins 2 ans, raison pour laquelle je ne serai pas vacciné.

*Ville de Boma- **KONGO-CENTRAL***

REPONSE

Les vaccins anti-COVID-19 ont bien été expérimentés sur des animaux. Différentes expérimentations ont fait l'objet de publications scientifiques : sur des primates, sur des hamsters, sur des macaques ou encore sur des souris et des cochons d'Inde.

De façon générale, le modèle de développement des vaccins comporte, avant de commencer les essais cliniques sur les humains, des études précliniques sur des modèles animaux connus pour présenter de grandes similarités avec notre espèce.

Mais, étant donné que les expérimentations animales habituelles sont trop longues, certaines d'entre elles ont été effectuées simultanément avec les essais sur l'humain.

CE QU'ON A ENTENDU :

Pourquoi le vaccin anti-COVOD-19 provoque la myopie, le vertige, etc. ?

*Ville de Goma - **NORD-KIVU***

REPONSE

Non, il n'existe aucun lien avéré entre vaccination et troubles oculaires.
Néanmoins, si aucune preuve confirmant l'existence d'effets secondaires importants affectant la vision ne s'est révélée pour le moment, il convient de noter au moins un cas isolé chez un professionnel de la santé, qui a présenté un gonflement des yeux après une injection anti-COVID-19.
Un rapport publié par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fait toutefois état d'autres effets secondaires « essentiellement légers à modérés ». Les réactions les plus courantes chez les personnes qui ont participé à l'étude étaient :

- Des symptômes au site d'injection (douleurs, gonflement, rougeurs) ;
- Des symptômes systémiques (fatigue, douleurs musculaires, frissons et fièvre) ;
- D'autres symptômes tels que des maux de tête et des nausées.

CE QU'ON A ENTENDU :

Le vaccin lui-même n'est pas une garantie car nous avons plusieurs cas qui meurent avec cette maladie alors qu'ils étaient vaccinés.

*Ville de Goma - **NORD-KIVU***

REPONSE

Les vaccins peuvent empêcher la plupart des gens de ne pas tomber malades de la COVID-19, mais pas tout le monde.
Même après avoir reçu toutes les doses recommandées et attendu quelques semaines pour que l'immunité se mette en place, il subsiste une possibilité d'être infecté. Les vaccins ne confèrent pas une protection intégrale (100 %) et des infections peuvent survenir, même chez les personnes qui ont été entièrement vaccinées.
C'est pourquoi, même après avoir été vacciné, il convient de continuer à prendre des précautions simples, comme assurer une distanciation physique, porter le masque, bien ventiler les pièces, éviter les foules, se laver les mains et tousser dans son coude ou dans un mouchoir. Faites-vous tester si vous êtes malade, même si vous avez été vacciné. Informez-vous des conseils en vigueur là où vous vivez et travaillez. Ne négligez aucune de ces mesures !

En cas de besoin d'informations complémentaires ou de signaler une rumeur et/ou fausse information circulant dans votre communauté sur la vaccination contre la maladie à coronavirus, veuillez contacter ces adresses :

E-mail : pbahati@internews.eu / Téléphone : +243 997714240