

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Ministère de la Santé pour répondre aux besoins en informations des communautés.

Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations, questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les partager avec les communautés. Ces questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.

CE QU'ON A
ENTENDU SUR:

LES ESPRITS DE NOTRE COUTUME HANDICAPENT LES GENS QUI NE RESPECTENT PAS LA TRADITION PUIS VOUS NOUS DITES QU'ILS SONT VICTIMES DE POLIOMYÉLITE POUR NOUS IMPOSER LA VACCINATION.

ENTENDU À
MBANDAKA
Janvier 2021



RÉPONSES

Les handicaps observés dans la communauté ne sont pas causés par les esprits de coutume. Ils peuvent être dus à la poliomyélite.

La Poliomyélite est une infection virale très contagieuse touchant principalement les enfants. Le virus se transmet par l'eau ou des aliments contaminés. Après s'être multiplié dans l'intestin, il envahit le système nerveux.


Dans de nombreux cas, l'infection reste asymptomatique, mais les sujets atteints excrètent néanmoins le virus dans leurs fèces et peuvent donc transmettre la poliomyélite à d'autres personnes.

Les symptômes initiaux sont : la fièvre, la fatigue, les céphalées, les vomissements, une raideur de la nuque et des douleurs dans les membres. Dans un petit nombre de cas, la poliomyélite entraîne une paralysie, souvent définitive.

Il n'y a pas de traitement contre la poliomyélite. Il est seulement possible de la prévenir par la vaccination.

CE QU'ON A
ENTENDU SUR:

NOUS NE VOULONS PAS VOS VACCINS CAR CEUX-CI SONT PLUS DESTINÉS AUX FEMMES. ILS RENDENT LES HOMMES IMPUISSANTS SEXUELLEMENT ET STÉRILES



RÉPONSES

Les vaccins ne sont pas liés au genre et ne peuvent pas causer l'impuissance ou la stérilité aux hommes. Il existe deux types de vaccins.

Le principal composant d'un vaccin est l'agent infectieux, ou une partie de celui-ci, responsable de la maladie contre laquelle il protège. L'agent infectieux (virus ou bactérie) est rendu inoffensif.

On distingue les vaccins "vivants atténués" des vaccins "inactivés" (ou tués).

Les vaccins vivants atténués contiennent un agent infectieux vivant. Le pouvoir pathogène du virus ou de la bactérie est atténué par différents procédés, de manière à ce que son administration n'entraîne pas de maladie (ou une maladie très bénigne).

Toutefois, par précaution, ces vaccins sont contre indiqués chez la femme enceinte et chez les personnes qui ne résistent pas aux maladies. Les vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la fièvre jaune et le vaccin oral contre la fièvre typhoïde sont des vaccins vivants atténués.

Les vaccins inactivés contiennent des agents infectieux (ou une toxine produite par ceux-ci) qui ont été tués grâce à un produit chimique ou par la chaleur. Ils sont donc totalement inoffensifs, mais restent capables de susciter une réponse du système immunitaire.

Le vaccin injectable contre la poliomyélite, les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'Haemophilus influenza de type b, l'hépatite A, l'hépatite B, le pneumocoque, la grippe, l'encéphalite à tiques d'Europe centrale, l'encéphalite japonaise, et la méningite à méningocoques (A, C, W, Y) sont des vaccins inactivés.

Les vaccins contiennent aussi des conservateurs et des antibiotiques qui empêchent leur contamination, ainsi que des stabilisants. Ces substances permettent de maintenir la qualité des vaccins entre leur production et leur administration.

Certains vaccins contiennent aussi des substances dites "adjuvantes" qui stimulent la réponse immunitaire à la vaccination. Ces substances augmentent l'efficacité des vaccins.



**CE QU'ON A
ENTENDU SUR:**

UNE FEMME ENCEINTE EST MORTE PAR NÉGLIGENCE DE NE PAS ALLER À LA CONSULTATION PRÉNATALE (CPN) SE CONFIANT À SA COUTUME QUI CONSIDÈRE QUE L'HÔPITAL EST UN LIEU PUREMENT SATANIQUE.

ENTENDU À
MBANDAKA
Janvier 2021



RÉPONSES

L'hôpital n'est pas un lieu satanique. C'est le seul lieu où la femme enceinte peut être prise en charge efficacement par un personnel compétent.

Les consultations prénatales sont essentielles car elles permettent d'offrir aux femmes enceintes une bonne prise en charge, un bon suivi et des informations. Les CPN conseillent les femmes en état de grossesse sur le mode de vie à adopter, y compris la nutrition. Elles permettent également de détecter et de prévenir des maladies, donner des conseils en matière de planification familiale et d'aider les femmes éventuellement victimes de violence du partenaire intime.

Suivant le nouveau modèle de l'OMS pour les soins prénatals, le nombre de consultations prénatales passe de quatre à huit. Des données récentes indiquent que l'augmentation de la fréquence des consultations prénatales dans le système de santé pour les femmes et les adolescentes est associée à une probabilité plus faible de survenue de mort-nés, car ces consultations offrent plus d'occasions de détecter et de prendre en charge d'éventuels problèmes.

Le fait de prévoir 8 consultations durant la période de grossesse au lieu de 4 permet de ramener le taux de mortalité périnatale à 8 pour 1000 naissances.

Ce nouveau modèle fait augmenter le nombre d'examen de la mère et du fœtus afin de détecter des problèmes, améliore la communication entre les prestataires de soins et les femmes enceintes et accroît la probabilité que la grossesse connaisse une issue positive. Il préconise qu'une première consultation ait lieu au cours des 12 premières semaines de grossesse et que les consultations suivantes soient prévues aux 20e, 26e, 30e, 34e, 36e, 38e, et 40e semaines.

Ce bulletin a été réalisé grâce au soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international (USAID).
Le contenu ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID et du gouvernement des Etats Unis.